

1. LOPUTAMINE

SOBIVAD LOPUTUSLAHUSED

AKUUTSED HAAVAD

kõik traumahaavad: löikehaavad, torkehaavad, hammustushaavad jne
õmblustega suletud haavad
põletushaavad

- * 0,9% naatriumkloriid ehk füsioloogiline lahus
- * Ringeri lahus
- * Aqua pro irrig. (steriilne vesi)
- * Prontosan© loputuslahus (kombineeritud)

KROONILISED HAAVAD /HAAVANDID/

diabeetiline haavand, veenihaavand, lamatis jne

- * Prontosan© loputuslahus (kombineeritud)

haava käsitus algab alati loputamise
uhub haavast mehhaaniliselt välja mustuse, mikroobid, surnud koed
teeb haavapõhja seisundi abistajale nähtavaks
haava loputatakse ka enne mikrobiaalsete külvide võtmist
haavaloputuslahused on steriilsed
haavaloputuslahuseid kasutatakse kehatemperatuuril

2. HAAVA ÜLEVAATUS JA KIRURGILINE TÖÖTLUS

KIRURGILIST TÖÖTLUST TEOSTAB ARST VOI ODE

loputatud haavas saab kahjustust objektiivselt hinnata
kahjustatud koesakesed eemaldatakse
musta nekroosi ilmnemisel eemaldada see kirurgiliselt

3. MITTEKIRURGILINE TÖÖTLUS

SOBIVAD PREPARAADID

- * Prontosan© loputuslahus ja geel
- mikroobse katu (biofilmi) eemaldamine mähiste, leotamise, geeli abil

4. ANTISEPTIKA

AKUUTSED HAAVAD

kõik traumahaavad
põletushaavad I-II aste
multiresistentsete mikroobidega koloniseeritud haavad

SOBIVAD TOIMEAINED & PREPARAADID

- * PVP-jood: Braunovidon© salv, Braunol©
- * Polüheksaniid: Prontosan© loputuslahus ja geel
- * Iooniline hõbe: Askina© Calgitrol Ag haavaside

KROONILISED HAAVAD /HAAVANDID/

ainult infitseeritud või kriitiliselt koloniseeritud haavandid

- * samad preparaadid lühiajaliselt (kuni 7 päeva)

5. NIISKUSE SAILITAMINE

põletushaavad
vähese eksudaadiga ja granulatsioonifaasis haavad ja haavandid

- * Prontosan© geel

6. SIDUMINE

Prontosan© sobib kasutamiseks koos kõikide haavasidemetega sh ioonilist hõbedat sisaldavatega
Askina© Calgitrol Ag võib kasutada iseseisvalt või kombinatsioonis sekundaarse imava sidemega rohke haavaeksudaadi korral